

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
16.08.2017 № 944
Регистрационное свидетельство
№ UA /16239/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства

МИКСТУРА ДЕТСКАЯ ОТ КАШЛЯ

Состав:

действующие вещества: экстракт алтеевого корня сухой (*Althaea officinalis L.*) (1: 10), экстракт солодкового корня сухой (*Glycyrrhiza glabra L.*) (1:8);
1 флакон содержит: экстракт алтеевого корня сухого (1:10) 4,0 г, экстракт солодкового корня сухого (1:8) 1,0 г;
вспомогательные вещества: анисовое масло, натрия гидрокарбонат, натрия бензоат, аммония хлорид, сахар.

Лекарственная форма. Порошок для оральной суспензии.

Основные физико-химические свойства: буровато-серый порошок с запахом анисового масла.

Фармакотерапевтическая группа.

Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A10.

Фармакологические свойства.

Препарат принадлежит к лекарственным средствам, которые стимулируют отхаркивание. Механизм действия связан с усилением физиологической активности мерцающего эпителия и перестальтического движения бронхиол, которое способствует продвижению мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее выведению. Этот эффект сочетается с усилением секреции бронхиальных желез, некоторым уменьшением вязкости мокроты.

Клинические характеристики.

Показания.

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем и затрудненным отхождением мокроты.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия;

нарушение функции печени и почек; гипокалиемия; тяжелая степень ожирения. Детский возраст до 2 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не применять с противокашлевыми средствами.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения.

Микстуру детскую от кашля следует назначать в комплексной терапии. Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется при приеме отхаркивающих, особенно секретомоторных препаратов, употреблять большое количество теплой жидкости.

Больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Препарат предназначен для применения детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет на скорость психомоторных реакций.

Способ применения и дозы.

Перед применением микстуру разводить кипяченой и охлажденной водой к отметке на флаконе "200 мл". Принимать внутренне после приема еды детям в возрасте от 2 до 6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 4-5 раз на сутки, детям в возрасте от 6 лет - по 1 десертной ложке (10 мл) 3-4 раз на сутки. Перед употреблением микстуру взболтать.

Продолжительность курса терапии определяется индивидуально врачом и представляет, как правило, 5-7 дней.

Дети.

Не назначают детям в возрасте до 2 лет.

Передозировка.

Передозировка и длительное применение (больше 2 месяцев) может вызывать нарушение водно- электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемической миопатии и миоглобинурии. Возможное усиление побочных реакций.

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: отмена препарата, промывания желудка.

Побочные действия.

Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может повлечь нарушение водно - электролитного баланса и привести к развитию гипокалиемии; в отдельных случаях возможные повышения артериального давления, гипокалиемическая

миопатия и миоглобинурия. Возможные аллергические реакции (кожные сыпи, зуд); гиперемия, отек; усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок пригодности.

1 год.

Препарат нельзя применять после окончания срока пригодности, отмеченного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Разведенную микстуру хранить в течение 10 дней при температуре от 2 до 8 °С.

Упаковка.

По 19,55 г в флаконе. По 1 флакону в картонной пачке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ПрАТ "Биолик".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Заявитель.

ООО "Украинская фармацевтическая компания".

Местонахождение заявителя.

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.

Дата последнего просмотра. 16.08.2017