


«УТВЕРЖДАЮ»

гл. врач



« » 2002 г.

ОПЫТ

применения комплексного гомеопатического препарата «**Холедиус**»

(ООО «Талион-А», Россия) при хроническом панкреатите и

хроническом холецистите.

Москва, 2002 г.



Комплексный гомеопатический препарат «Холедиус»

производится фирмой ООО «Талион-А» (ВФС 42-3101-98). В состав препарата входят Chelidonium D3, Carduus marianus D3, Berberis vulgaris D3, Podophyllum D6. Препарат показан при хроническом панкреатите и хроническом холецистите. Основные показания к применению гомеопатический монопрепаратов, входящих в состав комплексного гомеопатического препарата «Холедиус», представлены в таблице

Гомеопатический монопрепарат	Основные показания к применению
Chelidonium	Боли в правой части живота, боли под правой лопаткой, горький вкус во рту, желтый налет на языке, тошнота, рвота, отрыжка.
Carduus marianus	Боли в животе, белый налет на языке, рвота, обесцвеченный стул
Berberis	Налет на языке, боли в животе, диаррея.
Podophyllum	Диаррея, водянистый зловонный стул, боли в животе.

Противопоказаниями к применению препарата является повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Побочное действие не известно

Целью исследования явилась оценка клинической эффективности и безопасности применения комплексного гомеопатического препарата «ХОЛЕДИУС» при хроническом панкреатите и хроническом холецистите.

Под наблюдением в течение срока от одного до 6 месяцев находилось 73 больных (38 мужского и 35 женского пола) в возрасте



от 24 до 63 лет с основным диагнозом хронический панкреатит. Они составили 2 группы по 36 и 37 человек, сопоставимые по полу, возрасту, клиническим проявлениям панкреатита. Основная группа (36 человек) получала комплексный гомеопатический препарат «Холедиус» по 8-10 капель 1 раз в день на фоне лечебного питания и витаминотерапии. При обострении хронического панкреатита количество приемов препарата могло быть увеличено до 3-5 раз в день. В контрольной группе (31 человек) проводили традиционную базисную терапию, в состав которой входили антациды, анальгетики, спазмолитики, антигистаминные препараты, ферментные препараты, ингибиторы протеаз, поливитамины и диетическое питание.

При оценке эффективности препарата учитывались следующие субъективные и объективные показатели: боль в верхней половине живота, понос, падение массы тела, отрыжка тошнота, рвота, метеоризм, снижение аппетита, результаты копрологического исследования, результаты ультразвукового или рентгеновского исследования поджелудочной железы.

В основной группе болевой симптом уменьшался в среднем на 4-5 день, в контрольной, получавших традиционное лечение, – на 2-3 день. Синдром диспепсии в основной и контрольной группах купировался в среднем на 6-7 день. По результатам рентгеновского

исследования, проведенного через шесть месяцев после начала терапии значительных изменений не выявлено в обеих группах, по данным ультразвукового исследования, проведенного через 2 месяца после начала лечения, примерно в 30% в обеих группах выявлена положительная динамика, заключающаяся в уменьшении размеров поджелудочной железы, понижении ее оптической плотности, уменьшении признаков гипертензии внутрипротоковой гипертензии поджелудочной железы. Данные копрологического исследования, проведенные через 2 месяца после начала терапии, показали отчетливое улучшение в обеих группах – нормализация по показателям содержания в кале нейтральных жиров, крахмальных зерен, мышечных волокон. В обеих группах отмечалось увеличение массы тела от 1 до 4 кг.

При проведении контрольного обследования через 6 месяцев, выявлено что у 25 % больных, получавших «Холедиус» не было обострений хронического панкреатита, в контрольной группе этот показатель составлял 10%. Масса тела больных в основной группе больных увеличилась в среднем на 3,5 кг по сравнению с исходным показателем, в то время как в контрольной группе масса тела не отличалась от исходного уровня.

Побочных эффектов, связанных с приемом препарата «Холедиус», не зарегистрировано, больные отмечали переносимость препарата как «отличную».

Терапию препаратом «Холедиус» получали 46 больных в возрасте от 28 до 55 лет с основным диагнозом хронический холецистит, у всех больных сопутствовали гастродуоденит и панкреатопатия. Препарат «Холедиус» назначали по 8-10 капель 3 раза в день в течение 3 месяцев. Контрольная группа составляла 25 больных. В обеих группах проводилась традиционная этиотропная и патогенетическая терапия, в состав которой входили бактериофаги, пробиотики, антисекреторные средства и ферменты, лечебное питание. Оценку состояния больных проводили по данным динамического клинического наблюдения, лабораторных методов исследования, УЗИ органов брюшной полости и ЭГДС.

Отмечены достоверные различия в сроках наступления выздоровления или ремиссии при сравнении положительной динамики в уменьшении или исчезновении клинических симптомов, которая была в 1,8 раза быстрее у больных основной группы, чем в контрольной группе. В группе больных, получавших препарат «Холедиус», значительное улучшение состояния наступило через 2,8 месяца у 56% больных, тогда как в контрольной группе – через 4,5 месяца от начала лечения в 33% случаев. В 25% случаев через 6

месяцев после начала лечения в обеих группах выявлена положительная динамика показателей ультразвукового исследования желчного пузыря. Побочных эффектов на фоне приема препарата «Холедиуса» не отмечено.

Таким образом, опыт применения комплексного гомеопатического препарата «Холедиус» в терапии хронического панкреатита и хронического холецистита, с участием 144 больных, с использованием динамического клинического наблюдения и методов объективной оценки, свидетельствует об эффективности и безопасности терапии препаратом при данных заболеваниях.

Врач

